

|                            |                                                            |                         |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>566948            | Paciente:<br><b>Marya Samyra Sousa</b>                     | Sexo:<br>Feminino       | Idade:<br>16 (A)    |
| Atendido em:<br>14/01/2026 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Registro Geral:<br>CPF: | Convênio:<br>Hismet |

## BETA HCG QUANTITATIVO

< 2.0 mIU/mL

Método: Imunofluorescência Material: Soro Coletado em: 14/01/2026 Liberado em: 14/01/2026 18:05

Valores de Referência:

Negativo - < 5,0 mIU/mL

Positivo - ≥ 25,0 mIU/mL

| Possíveis semanas | Faixa mIU/mL     |
|-------------------|------------------|
| 3 semanas         | 5.8 - 71,2       |
| 4 semanas         | 9.5 - 750        |
| 5 semanas         | 217 - 7.138      |
| 6 semanas         | 158 - 31.795     |
| 7 semanas         | 3.697 - 163.563  |
| 8 semanas         | 32.065 - 149.571 |
| 9 semanas         | 63.803 - 151.410 |
| 10 semanas        | 46.509 - 186.977 |
| 12 semanas        | 27.832 - 210.612 |
| 14 semanas        | 13.950 - 62.530  |
| 15 semanas        | 12.039 - 70.971  |
| 16 semanas        | 9.040 - 56.451   |
| 17 semanas        | 8.175 - 55.868   |
| 18 semanas        | 8099 - 58.176    |

Nota:

### NOTAS:

- 1- Concentrações de B-HCG menores que 5 mIU/mL são considerados como resultados negativos.
- 2- Se os resultados dos testes forem iguais ou superiores a 25 mIU/mL, são considerados como um resultado positivo.
- 3- Os resultados dos testes de concentração entre 5 e 25 mIU/mL, serão relatados como indeterminados, pois não se pode ainda inferir nenhuma interpretação, recomenda-se a critério médico a confirmação do exames após 7 dias.
- 4- O hCG aparece no soro de mulheres grávidas cinco dias após a implantação do blastocisto e a sua concentração aumenta continuamente até ao terceiro mês da gravidez.
- 5- Resultados do teste devem ser utilizados com outras informações clínicas, tais como histórico médico, sintomas e performance clínica.
- 6- Medicamentos e outras substâncias internas podem interferir nos resultados dos testes.
- 7- Mulheres na menopausa podem apresentar um resultado positivo pela alteração hormonal. Recomenda-se repetir o teste depois de 48 horas ou utilizar outros testes β-hCG.



Assinado Digitalmente



**Dr. Bruno Bini Napoleão**  
Biomédico  
CRBM - 2121